

GAZI UNIVERSITY, GAZI HOSPITAL, ANKARA,
TURKEY


ИЗВЕШТАЈ ЗА ДНЕВНИ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА
ЕДУКАЦИЈА

Д-Р БЛАГОЈ ШУНТОВ, СПЕЦИЈАЛИЗАНТ ПО
НЕВРОХИРУРГИЈА, ЈЗУ УК ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА
СКОПЈЕ.

- 1.Ревизија на субокципитална декомпресија на задна мозочна јама и Ц1 ламинектомија кај пациент со Arnold-Chiari type II малформација.




- ▣ 2. Деснострани фронторбитална остеопластична краниотомија кај 52-годишна пациентка со olfactory groove менингиом.




- ▣ 3. Пациент со синус каверносус синдром и наод на левостран синус каверносус менингиом, реализирана беше левостана птерионална остеопластична краниотомија и транссилвиев пристап до туморот, употребена беше CUSA, и инфратенторијалниот дел од туморот беше оставен за оперативен третман во втор акт со ретросигноиден пристап. Индициран беше третман со Gamma knife на резидуалниот тумор.



- 4. Доенче на 8-месечна возраст со наод на интравентрикуларен тумор, реализирана беше ексцизија на истиот со деснотрана париетална остеопластична краниотомија и пратен оперативен материјал за патохистолошка верификација.



- ▣ 5. Хроничен спонтан субдурален хематом кај пациент на 65 годишна возраст со хронична исхемична срцева болест на антикоагулантна терапија. Реализирана билатерална фронтопариетална краниектомија и поставена пасивна субдурална дренажа на истите.



- ▣ 6.Левострана Л4 радикулопатија и наод на дискална екструзија на Л4-Л5 нивото, реализирана беше левострана хемиламинектомија на Л4-Л5 нивото, истострана фораминомтомија и екстракција на дискалната екструзија.




- ▣ 7. Пациентка на 67 годишна возраст со претходно реализирана ексцизија на дифузна церебрална глиоматоза и левостана декомпресивна фронтотемпорална краниектомија, наод на рецидив на болеста и медикорезистентна епилепсија. Реализирана беше предна темпорална лобектомија.



- ▣ 8. Пациентка на 17 годишна возраст со секундарна медикорезистентна епилепсија со парцијални комплексни епи напади со секундарна генерализација и МРИ наод на каверном во левиот темпорален лобус. Реализирана беше предна темпорална лобектомија во која беше вклучена и лезијата видена на МРИ.



- ▣ 9.МРИ наод на рецидивантен глиобластом, претходно опериран пред 8 месеци. Реализирана беше итеративна рекраниотомија и ексцизија на опишаната лезија, при што беше користена интраоперативна неуронавигација.



- 10. Пациентка на 47-годишна возраст со клиничка презентација на тригеминална невралгија, реализирана МРИ на мозок и ДСА на церебралните крвни садови, артериска и венска фаза, со наод на луп на аберантна горна петрозна вена која притиска на излезиштето на тригеминалниот нерв. Пациентката оперирана во супинациска положба со глава поставена на Mayfield фиксатор и лесно свртена кон десно.

