

Едукација - Анкара


Др.Шерафедин Беба



Steven-Johnson syndrom:

se raboti za mukokutana boleost koja se javuva po kontakt so virusi NSA l ekovi mikoplazma, po kozata se javuvaat crveni I modri promeni so vezikuli I buli koi se bolni so odlupuvanje na kozata Ova dete bese hospitalizirano vo bolnicata, bese potrdeno pricinata bila Mycoplasma pneumoniae, vo pocetokot dadeno e 5 dena sistemski kortikosteroid I ednokratno IVIG, antibiotik parenteralno tecnosti se hranese so nazogastricna sonda. Poradi zafakanjeto na okoto se pravese tretman I na okoto so vestcki solzi i antibiotik a kozata bese pokriena so vlazni kompresi. ova e slika po dve nedelen tretman

Spirometry: Flow-Volume Pre/Post




time		09:36			10:15		
medicament							
parameter	unit	pred.	pre	%pred.	post	%pred.	post%pre
FVCex	l	1.99	2.00	100	2.03	102	2
FEV1	l	1.72	1.53	89	1.89	110	24
FEV1/IVC	%	85					
FEV1/FVC	%	86	77	89	93	109	22
PEF	l/s	4.14	3.44	83	4.30	104	25
MEF75	l/s	3.74	2.10	56	4.17	112	99
MEF50	l/s	2.84	1.32	50	2.36	90	79
MEF25	l/s	1.35	0.75	56	1.28	95	69
MEF25-75	l/s	2.29	1.28	56	2.19	96	72
Aex	l/s	3.29	2.90	88	4.73	144	63



Spirometrija: po napravenata spirometrija provereno bese reverzibilnost .Dadeno bese 4 pafa Ventolin po sto spirometrijata pokaza reverzibilnost od 24% Sprema GINA preporakite reverzibilnost >12% se racuna pozitiven

Challenge test report



EV1 Threshold : -20 % Threshold dose: 14.17 mg/ml

me	Medication	FEV1	FEV1/FVC	MEF50	Roccc	RAWtot
ed.		2.94	84	4.36	0.30	0.30
lue		3.02/103	99/117	3.91/60		
49						
20	Solution NaCl 0.9 %	2.95/98	94/96	3.79/97		
24	Metacholine 0.0625 mg/ml	2.83/94	100/101	4.47/114		
28	Metacholine 0.25 mg/ml	2.88/95	99/101	4.23/108		
32	Metacholine 1.0 mg/ml	2.80/93	95/96	3.42/88		
36	Metacholine 4.0 mg/ml	2.79/92	95/96	3.64/93		
40	Metacholine 16.0 mg/ml	2.38/79	98/99	3.14/80		
54	Spasmolyticum 1.5 mg/ml	2.85/95	83/94	3.59/92		


Comment:

DR Hilgert Health Union Germany Tel: +49 9738 9181-0

Test: 06.11.2015 / 10:54
9776 21 / 11/13 / 22 (°C) / mbar (%)



Metaholinski test: Po predhodno merenje na TA I puls se napravi spirometrija po sto se zapocna postapkata so metaholinskiot test. Prvo vo aparatot se stavi fizioloski rastvor bolniot vdisuvase pa se napravi spirometar, po 5 min vdisuvase metaholin 0,0625mg/ml pa se napravi spirometar potoa vdisuvase metaholin 0,25mg/ml pa napraven bese spirometar, potoa od koncentracija 1,0mg/ml potoa 4,0mg/ml potoa 16.0mg/ml potoa bese daden 4 pafa ventolin po to se dobi pozitiven rezultat od testot kako sto se gleda vo grafikonot



Hlufu1-ztm / Hyperreagibility-Report of 25.11.2015


Spire
ZFN

Kaymak, Melek
ID-Nr: 000000574430
Comment: soner

Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Alerji , İmmünoloji Bölümü

147 cm, 40 kg, female *05.08.2005 =10Y
Test: 25.11.2015 / 15:26 h

Challenge test report



FEV1 Threshold : -20 % Threshold dose: ---

Time pred. value	Medication	FEV1	FEV1/FVC	MEF50	Rocc	RAWtot
14:00		2.17	86	3.18	0.45	0.45
		2.09/96	100/116	3.17/100		
14:43	Egzersiz 1.0 dk	1.88/90	100/100	2.85/90		
14:45	Egzersiz 3.0 dk	1.97/95	101/101	3.07/97		
14:47	Egzersiz 5.0 dk	2.12/101	93/93	2.91/92		
14:51	Egzersiz 10.0 dk	2.07/99	101/101	3.23/102		
14:57	Egzersiz 15.0 dk	2.12/102	96/95	3.58/112		
15:04	Egzersiz 20.0 dk	1.97/94	100/100	3.28/103		
15:11	Egzersiz 30.0 dk	2.20/105	96/96	3.35/106		
15:26	Spasmolyticum 1.5 mg/ml	2.11/101		3.75/118		

Comment:

© 2008 nSpire Health GmbH Germany Tel: +49 9736 8181-0

Test: 25.11.2015 / 15:26
BTPS: 21 / 1013 / 20 [°C / mlbar / %]

Test so fizicki napor. Predhodno se merese tenzija puls I saturacija na kislorod. se napravi spirometrija. Zapocnato so fizicki napor od deset minuti na ergometar. Po završevanju na fizicki napor se napravi spirometar, koj se povtoruvase na 3min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min pa e daden Ventolin 4 pafa pa e napravljen spirometar



Provokacijski test so lek Oksalamin(antitusik)Poradi pozitivna anamneza na pojava na alergija na lekot odluceno bese da se napravi provokacijski test so lekot.Se dade edna kapka,Po 20 min se dade 1 ml,po 20 min se dade 2,5ml po sto deteto dobi urteki po kozata vednas se dade antihistaminik I kortko se napravi spirometrija se monitorirase pulsot I tenzijata poradi pojava na edem na sakite I usnite kako I treska se dade Adrenalin 0,01mg/TT vo nadvoresna butna regija intramuskularno.Po 60min promente po kozata pocnaa da se stivnuvaat.Poradi možnost od bifazicna reakcija deteto bese hospitalizirano za monitoriranje 24 casa.



Na oddelot po Alergija se rabotese sekojdnevno spirometrii od 5 god
voznost prick testovi inhalatorni I nutritivni,prick-to prick,provokacijski
testovi so hrana I so lekovi,imunoterapija supkutana,SCIT I
sublingvalnaSLIT Venom terapija na pcela
edukacija za upotreba na lekovite so optichember.Inhalaciite isklucivo se
pravea so Optichember so adekvatena maska za voznost na deteto,pri
obstrukcija se davase prema stepenot na obstrukcija od 2-6pafa
bronhodilatator koi se povtoruvaa na 20min tri pati.
Vo ovaa moja edukacija mnogu mi pomogna sefot na oddelot
Prof.Dr.Ilknur Bostanci Doc.Dr.Serap Ozmen sto posebno im se
zablagodaruvam.