

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДР.
МАГДАЛЕНА ЈОРДАНОСКА –
СПЕЦ. ОРЛ ВО КБЦ “ЗВЕЗДАРА -
БЕОГРАД” НА КЛИНИКА ЗА УВО,
НОС И ГРЛО







- ▣ Цел аудиологија реализиран во фоноцентар, а тема BPPV (бенигно позиционо пароксизмално вертиго) или cupulolithiasis
- ▣ BPPV – нарушување на периферен вестибуларен рецептор сместен во семициркуларните канали на внатрешното уво
- ▣ Нормално во сидовите на семициркуларните канали utricle и saccule постојат творби во вид на кристали слични на CaCO_3 наречени отоконии

- ▣ Поради дегенеративни промени, последица на отитиси, вирози, ототоксикози, повреди на лабиринтот или последици на ушна хирургија доаѓа до откинување на отокониите, нивно пливање во ендолимфата и таложење врз куполата на семициркуларните канали
- ▣ Тоа доведува до возбуда на куполата и појава на краткотрајно вертиго кое трае неколку секунди и не повеќе од минута пропратено со наузеа и нистагмус
- ▣ Ова се јавува во пароксизми и меѓу нив постојат ремисии, а појавата е со промена на позицијата на главата

- ▣ Dg: Отоскопија
- ▣ Тимпанометрија
- ▣ ADG
- ▣ Head shaking ротаторен тест и stepping тест
односно тест на компасен од
- ▣ BERA
- ▣ Терапија
 - Halpike маневар – репозициона процедура т.е тенденција
за разместување на кристалите од куполата
- ▣ Антивертигинозни супресори (еглонил, торекан)
- ▣ Антихолинергици (централна супресија - седативи)

- ▣ Подобрување на исхраната на мозочното ткиво (витаминска терапија)
- ▣ Хируршки - оклузија на каналот и негово полнење со фибриноген или сомлена коска
- ▣ Селективна секција на n.vestibularis



Благодарам