

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ЕДУКАТИВНИОТ ПРЕСТОЈ ВО БОЛНИЦАТА CERRANRAŞA - ИСТАНБУЛ

ОД ПРИМ. Д-Р ЛИДИЈА ГРБЕВСКА
ВО ПЕРИОД ОД 19 АПРИЛ ДО 15 МАЈ 2015 ГОДИНА

- Современата медицинска едукација во Турција започнува со основањето на медицинското училиште Darülfünunu кое е основано од Махмут II на 14 март 1827 година.
- Со помош на реформите на универзитетот, извршени во 1933 година, Факултетот за медицина е формиран во рамките на истанбулскиот универзитет, а една од болниците е именувана како Cerrahpaşa.
- Името, Cerrahpaşa, е преземено од хирургот Мехмет паша, кој бил хирург на Дворот во времето на султанот Мурат III и султанот Мехмет III, и кој подоцна станал голем везир.
- На 14 Декември 1930 година, Ататурк ја посетил болницата и бил воодушевен, при што изјавил дека негова желба е зголемување на капацитетите на болницата кое се исполнува.



Болницата Cerrahpaşa денес има 39 главни
одделенија, во кои работат 1100 лекари.
Образовниот кадар се состои од 420 професори, 150
вонредни професори, 6 доценти.



- Во првата недела од мојот престој, го посетив одделот за општа хирургија во која има 18 операциони сали во која работат 54 анестезиолози, под водство на госпоѓа Проф. Д-р Гунир Кокшал.
- Единицата за интензивно лекување во склоп на оперативниот блок располага со 12 кревети со најсовремен мониторинг систем, под водство на Доц. Д-р Тугхан Утку.



Одделот за гинеикологија и акушерство е во издвоена зграда во чии склоп се наоѓа и онколошкиот центар.



Гиниколошко-акушерската болница
располага со четири најсовремено
опремени операциони сали (со
најсовремен мониторинг систем и
задолжителен вормер систем) од кои
една акушерска, една онколошка, и
две гинеколошки сали. Работат
вкупно четири до шест
анестезиолози.



- Началничка на анестезиолошкиот тим е Доц. Д-р Нилгун Кокчоглу



Годишно на клиниката за гинекологија и акушерство во болницата Serrahpaşa има околу 3000-3500 породувања од кои 66% завршуваат со царски рез. Во склоп на гинеколошката Клиника се наоѓа и најсовремената единица за неонатолошка интензивна нега што го оправдува високиот процент на царски резови.


Регионалните анестезии конкретно - спиналната анестезија за царски рез се изведува исклучиво со хипербарен 0,5 % бупивакаин.




Нова метода

- Новина со која се запознав при мојот престој во болницата Cerrahpaşa во Истанбул е методата на TRANSVERSUS ABDOMINALIS PIANE BOLCK (TAPB). Оваа метода се користи за постоперативно обезболување кај пациенти со поопсежни хируршки интервенции и се изведува од анестезиолог едуциран за оваа метода, со посебни сетови за таа намена.

- Потребно е портабл ехо-апарат со абдоминална сонда и посебен сет за аплицирање на анестетикот. Самата метода се состои во обострано аплицирање на локален анестетик 0,5% бупивакаин 10 милилитри, плус 5 милилитри 2% лидокаин, растворени со уште 15 милилитри физиолошки раствор. Истата се изведува пред екстубација и будење на пациентот.



Моето искуство како и искуството на колегите од болницата Cerrahpaşa во Истанбул од методата TAPB е многу позитивно затоа што обезбедува одлична постоперативна аналгезија во траење од 10 до 15 часа.



Мото на анестезиолозите од болницата Cerrahpaşa