



Стегнатите искуства од едукативниот стручен престој во Љубљана, Република Словенија (Едукација од областа на родилни сали)

***Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство - Скопје
Клиника за Гинекологија и Акушерство, Универзитетски Клинички центар Љубљана
(28.Септември – 23.Октомври, 2015 година)***

М-р Д-р Адела Стефанија

Датум на презентација: 10.11.2015 година





КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

- НАЈГОЛЕМ ТЕРЦИЕРЕН ГИНЕКОЛОШКИ И
АКУШЕРСКИ ЦЕНТАР

ОДДЕЛ ЗА ПЕРИНАТОЛОГИЈА

- 1/3 ОД ВКУНИОТ БРОЈ НА ПОРОДУВАЊА НА
ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
- 3 АМБУЛАНТИ ЗА ПЕРИНАТОЛОШКИ УЛТРАЗВУК
- 1 АМБУЛАНТА ЗА РИЗИЧНИ БРЕМЕНОСТИ
- 1 АМБУЛАНТА ЗА ИНТЕРВЕНТЕН УЛТРАЗВУК И -
- ИНВАЗИВНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРОЦЕДУРИ
- ОДДЕЛ ЗА ПАТОЛОШКА БРЕМЕНОСТ
- ОДДЕЛ РОДИЛНИ САЛИ





РОДИЛНА САЛА- ново породилиште

- Престој под менторство на Доц. Д-р Наташа Тул Мандиќ
- 15 родилни кревети и 11 родилни боксови (нема организиран простор на предродилна сала)
- 2 операциони акушерски сали
- Соба за 24 часовна помош на пациентки со нерегуларен утерин активитет, нереактивни NST записи, или други состојби кои бараат подолг мониторинг и евентуален прием





ОДДЕЛ ЗА ПАТОЛОШКА БРЕМЕНОСТ

- 16 ДВОКРЕВЕТНИ СОБИ
- УЛТРАЗВУЧНИ И ВАГИНАЛНИ ПРЕГЛЕДИ (СЕКОЈ ЛЕКАР ВО БОЛНИЧКАТА СОБА ЗА КОЈА Е ОДГОВОРЕН)

3 АМБУЛАНТИ ЗА АКУШЕРСКИ УЛТРАЗВУК

- Програма за пренатален перинатолошки скрининг → предложени 3 ултразвучни прегледи во тек на целата бременост, за детална фетална евалуација, скрининг за анеплоидии и фетални структурни аномалии



ST

DRUSKONIC	SAJINA	FRANJAN	COLETO
E7 LORBERT MOSKA	E8 DARJEKOVIC ANA Anina 4/29	E9 DOLJANAC DOLJANAC	E10 FRANJAN BOHANA
FRAN JANA		DOBAC VERONIKA	

DRUSKONIC	SAJINA	FRANJAN	COLETO	STEBLOVIC	STEBLOVIC
E6	E5 PULIC BOJAN ELITA	E4 BERGANJ ALEKSA	E3 KOPRIVIC NATASA	E2 GREBENC BARBARA	E1 KOLJAC LARA
	CEKIC ANJA	DELIBASIC NIZAMA	DE PAR ELITA		STREBEC PETRA II.
	SMENJET ANA	JESENKO VESNA			HANDANOVIC ALEKSANDRA
TUREZAR LEO NINA 25.4			MIJIC MARTINA	PECANOVIC ISMA	





АМБУЛАНТА ЗА ИНТЕРВЕНТЕН УЛТРАЗВУК

- Инвазивни дијагностички процедури, амноцентеза и хорион биопсија, секој ден од 9-11h, потоа истата амбуланта функционира како ултразвучен перинатолошки кабинет






СТРОГО ДЕФИНИРАНИ ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТА


- Индикации за оперативно завршување на раѓање
- Инравенска апликација на простагландини
- Употреба на атосибан
- Тромбопрофилакса (само кај одредена група на пациентки)
- Антибиотска профилакса кај спонтано прснат воденик



Višina nosečnosti: 34 - 37 0/7 z razpokom plodovih ovojev



Višina nosečnosti: <34 0/7 brez razpoka plodovih ovojev



PROSTIN E2 V INFUZIJI

(0,75 mg)
1 ampula PROSTIN E2 v 500ml 5% glukoze

začetna doza: 4 gtt/min oz. 12 ml/h

Če po 40 min ni popadkov, zvišaj na 8gtt/min,
nato do 16 gtt/min. Po naročilu zdravnika tudi
do 32 gtt/min.

KONTRAINDIKACIJE:
preobčutljivost na PGE
stanje po s.c.
fetalni distres
astma....

NE OBENEM SYNTOCINONA!

1. korak:
začetna bolusna iv. injekcija **6,75mg** v **0,9ml** se injicira 1 minuto
v veno (ena steklenička **Tractocile® 7.5mg/ml- MODRA
EMBALAŽA**).

2. korak:
pripraviš **10 ml** raztopine atosibana (dve 5ml steklenički
Tractocile® 7,5mg/ml, - VIJOLIČNA EMBALAŽA)
in dodaš v **90ml 0,9% NaCl**. Infuzija naj teče **3 ure s hitrostjo
24ml/h**.

3. korak:
po 3 urah zmanjšaj odmerek na **8ml/h do največ 45 ur** (skupaj z
bolusom 48 ur) oziroma dokler popadki ne popustijo.

Skupna doza atosibana po bolusu in 3 urah infuzije je $6,75\text{mg} + 54\text{mg} = 60,75\text{mg}$. Po 3. urah infuzije ostane 28ml raztopine. Zdravilo lahko razredčimo tudi z Ringerjevimi laktatom ali s 5% raztopino glukoze.



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО





Заклучоци/Научени лекции

