

ЕДУКАЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ВО ДЕТСКА КЛИНИКА-ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЈА, Р.БУГАРИЈА

ЈЗУ.Здравствен Дом -Струмица
Токуда Болница Софија,Р.Бугарија
(Јуни 2016година)
Д-р.К.Џатева Митрева
(специјализант по Вонболничка педијатрија)

Датум на презентација:2016 година



Болница Токуда Софија е лоцирана во јужниот дел од град Софија. Истата е јапонска инвестиција, создадена од д-р. Т. Токуда, многупрофилна болница од 37 клиники и одделенија во која работат висококвалифицирани медицински екипи во најсовремени медицински услови веќе неполни 10 години (од 2006 год)



-структура на Болница Токуда София

Во својство на лекар на едукација во странство, имав привилегија да престојувам, а воедно и да се едуцирам на Клиника по детски болести во периодот од 06.06.2016г.-24.06.2016година.

Клиниката по педијатрија се состои од четири амбуланти од кои едната е опремена со ЕХО-апарат, локализирани на приземје, и од детско одделение со вкупно 32 болнички кревети, локализирано на 8-ми спрат.

Во Клиниката по педијатрија работат 12 доктори педијатри суб-специјалисти и 20 медицински сестри.

Поделена е на повеќе сектори и тоа:

- детска пулмологија со алергологија;
- детска гастроентерохепатологија;
- детска ендокринологија;
- детска ревматологија;
- детска нефрологија;



-педијатарски амбуланти



-детско отделение

Тринеделната едукација се одвиваше под менторство на Д-р.Калин Лицички,специјалист по детска ревматологија(началник на Детска Клиника).

Едукацијата се состоеше од:

- секојдневно присуство и учество во утрешните рапорти;
- секојдневно присуство и учество во утрешните визити на хоспитализираните пациенти;
- назначување на соодветни испитувања(лабораториски анализи,ренд-генолошки ,еходијагностички,ендоскопски испитувања и сл.);
- интерпретирање и толкување на веќе добиените резултати од назначените испитувања;
- работа по протоколи;
- работа во амбуланта;
- присуствував при вршење на специфични испитувања(ехо на абдомен гастроскопија,колоноскопија и подготовка на пациентот за нивно спроведување,алерголошки тестови,ОГТТ,провокациони тестови за следење нивото на одредени хормони,изготвување на дневно мени и водење на дневници за самоконтрола кај деца болни од Diabetes Mellitus итн.);

Особено впечаток ми остави следното:

- се прави Montoux-тест на секој белодробно болен со неизјаснета етиологија со цел уточнување на дијагнозата;

- визитата на хоспитализираните пациенти се води без присуство на медицинска сестра;

- во амбуланта се дели терапија строго само за перорална и пер-ректална администрација, додека парантерална терапија се дели само на одделение на хоспитализирани болни;

- амбулаторно спроведениот преглед е всеопфатен т.е освен анамнеза,

статус, физикален преглед, истовремено се даваат совети за правилен раст, развој, исхрана на детето, совети во врска со имунизацијата и има можност за вршење на ехографски, редгенолошки, лабораториски и сл. прегледи во денот на амбулаторниот преглед, со што се добива комплетна слика за состојбата на болниот истиот ден и можност да се постапи правилно соред барањата на дијагностицираното заболување;

- ендоскопските испитувања се прават строго под општа анестезија;

- ставено е силен акцент и се води сметка за превенција и контрола од интрахоспитални инфекции;

- работата се врши тимски и со професионализам во една мирна и при-

јатна атмосфера адаптирана токму за најмалите;

итн.

За време на едукацијата имав можност да се запознаам со календарот на задолжителните вакцини во Р.Бугарија како и на оние кои се по желба на родителите.

Како и во Р.Македонија и во Р.Бугарија се користат поливалентни вакцини.

Разликата е во тоа што во задолжителните вакцини е вклучена конјугирана пнеумококна вакцина во три дози (со поли 2м, 3м и 4м) во доза од 0,5ml IM.

Вакцините против HPV и ротавирус се незадолжителни. Се води силна кампања за воведување во редовните вакцини, но мислењата за истите се различни.

ТЕМПЕРАТУРА

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАВЪРШЕНА ВЪЗРАСТ	ИМУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ	ВАКСИНА	НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
През първите 24ч. след раждането	Хепатит В (I прием)	Рекомбинантна хепатит В ваксина	мускулно, 0.5 мл
От 48-ия ч. след раждането	Туберкулоза	БЦЖ ваксина	вътрекожно, 0.1 мл
1-ви месец	Хепатит тип В (II прием)	Рекомбинантна хепатит В ваксина	мускулно, 0.5 мл
2-ри месец	Полиомиелит, Дифтерия, Тетанус, Коклюш, Хемофилус инфлуенце тип В (I прием)	Комбинирана 5-компонентна ваксина срещу Дифтерия, Тетанус, Коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана Полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В Конюгирана пневмококова ваксина	мускулно, 0.5 мл
3-ти месец	Пневмококи (I прием)	Комбинирана 5-компонентна ваксина срещу Дифтерия, Тетанус, Коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана Полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В Конюгирана пневмококова ваксина	мускулно, 0.5 мл
4-ти месец	Полиомиелит, Дифтерия, Тетанус, Коклюш, Хемофилус инфлуенце тип В (II прием)	Комбинирана 5-компонентна ваксина срещу Дифтерия, Тетанус, Коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана Полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В Конюгирана пневмококова ваксина	мускулно, 0.5 мл
6-ти месец	Пневмококи (III прием)	Комбинирана 5-компонентна ваксина срещу Дифтерия, Тетанус, Коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана Полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В Конюгирана пневмококова ваксина	мускулно, 0.5 мл
7-ми месец	Хепатит тип В (III прием)	Рекомбинантна хепатит В ваксина	мускулно, 0.5 мл
12-ти месец	Проверка за белег от БЦЖ имунизация. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се реимунизират	БЦЖ ваксина	вътрекожно, 0.1 мл
13-ти месец	Реимунизация пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (IV прием)	Конюгирана пневмококова ваксина	мускулно, 0.5 мл
16-ти месец, не по-рано от 1г. след III прием	Морбили, паротит и рубеола	Комбинирана ваксина морбили, паротит и рубеола	мускулно, 0.5 мл
6 години	Реимунизация - полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IV прием)	Комбинирана 5-компонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В	мускулно, 0.5 мл
7 години	Реимунизация - полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)	Комбинирана 4-компонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина	мускулно, 0.5 мл
11 години	Реимунизация - туберкулоза (след отрицателна проба Манту)	БЦЖ ваксина	вътрекожно, 0.1 мл
12 години	Реимунизация - морбили, паротит и рубеола Реимунизация - тетанус и дифтерия	Триваксина морбили паротит и рубеола ТД ваксина	мускулно, 0.5 мл
17 години	Реимунизация - морбили, паротит и рубеола Реимунизация - тетанус и дифтерия	ТД ваксина	мускулно, 0.5 мл
От 25-ата година, през 10 години	Реимунизация - туберкулоза (след отрицателна проба Манту)	БЦЖ ваксина	вътрекожно, 0.1 мл
	Реимунизация - тетанус и дифтерия	ТД ваксина	мускулно, 0.5 мл



*В сила от 01.01.2010 (Прегледи и заключителни разпоредби, § 13 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ - бр. 45/2005, обн. в ДВ бр. 57 от 24.07.2006г.)

-имунизационен календар во Р.Бугарија



-дел од едукативен материјал за незадолжителните вакцини

Во Токуда Болница Софија се спроведуваат специјализации од различни профили. Имав можност да се запознаам со специјализант по педијатрија и да се запознаам со програмата за специјализација. Предност е тоа што специјализацијата по педијатрија трае 4 години од кои првите две се по општа педијатрија а останатите две се по субспецијализацијата што ја избираш пред започнување со специјализирање. По 4 години добиваш диплома за педијатар субспецијалист.



Чест и задоволство ми беше да бидам дел од вакви високо реномирани медицински установи,макар и на кратко. Стекнатото искуство и нови знаења несебично ќе бидат споделени со останатите колеги со цел унапредување на нашиот здравствен систем и пружењето на поквалитетни здравствени услуги на пациентите.

Ви благодарам на вниманието!!!

д-р.Катерина Цатева Митрева
специјализант по Вонболничка Педијатрија